

COMUNICAT

În urma analizelor efectuate, Institutul Cantacuzino a confirmat existența unor cazuri de infectare cu virusul West Nile pe teritoriul României.

Acestea au apărut în contextul epidemiologic existent în luna august într-o serie de țări apropiate de România. Cazuri au fost semnalate în Grecia, Rusia (zona Mării Negre), precum și alte țări din Europa.

În acest context, Ministerul Sănătății a solicitat din partea sistemului național de supraveghere epidemiologică intensificarea unor activități de depistare, diagnostic și diminuare a riscului pentru apariția unor cazuri în România.

Ministerul Sănătății a solicitat convocarea de urgență a comisiei de epidemiologie pentru elaborarea unor măsuri suplimentare privind organizarea supravegherii la nivelul tuturor eşaloanelor de asistență medicală a tuturor situațiilor de risc și ale cazurilor de boală compatibile cu infecția West Nile.

Măsurile preconizate vizează:

- Intensificarea activității de supraveghere pe baza metodologiei de prevenire a infecției West Nile, implementate încă din anul 2008 pe baza reglementărilor din Comunitatea Europeană și metodologia ECDC;
- Solicitarea rețelei pentru implementarea raportării telefonice imediate a cazurilor suspecte depistate la nivelul spitalelor/secțiilor de boli infecțioase;
- Atenționarea medicilor de familie, mai ales din zonele în care s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire, pentru abordarea complexă, după caz, trimiterea la secția de boli infecțioase a tuturor cazurilor de stare febrilă fără o cauză clară elucidată;
- Intensificarea colaborării rețelei de supraveghere în vederea asigurării diagnosticului bolii West Nile la Nivelul INCDI Cantacuzino și Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, conform arondării teritoriale stabilite;
- Internarea și îngrijirea corectă a tuturor cazurilor suspecte sau compatibile cu diagnosticul de West Nile la nivelul secțiilor/spitalelor de boli infecțioase;
- Intensificarea colaborării DSP-urilor cu Instituția Prefectului și administrațiile publice locale pentru realizarea măsurilor nespecifice de prevenire (de ex. dezinsecții);
- Avertizarea, prin DSP, a sistemelor de hemovigilență din centrele de transfuzii privind restricțiile la donare sau transplant de organe de la populația comunităților afectate de infecție confirmată pentru o perioadă de 28 de zile;
- Anunțarea sistemului european de alertă EWRS.

În acest context, specialiștii recomandă populației să ia măsuri de protecție:

- să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi.,
- să utilizeze substanțe chimice repelente de țânțari
- să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă
- să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriilor, să îndepărteze recipientele de apă stătută.

Infecția West Nile apare la populația adultă și poate avea efecte grave în cazul persoanelor predispușe la îmbolnăviri, având alte boli asociate (copiii trec, de regulă, neobservat peste infectarea cu virusul West Nile).

În cazul în care prezintă semne de boală – febră, dureri de cap, astenie, vărsături, tulburări de memorie, dureri articulare sau musculare, sau alte situații care survin în 3-7 zile de la o posibilă înțepare de țânțar, persoana să se prezinte de urgență la medicul de familie sau (cei neasigurați) la cel mai apropiat cabinet medical.

Ministerul Sănătății subliniază că toate aceste cazuri depistate și înregistrate în România sunt cazuri sporadice și în momentul de față nu comportă riscul unei epidemii de amploare. Deasemenea, sunt asigurate toate cele necesare pentru supraveghere, precum și, în caz de îmbolnăvire, de îngrijire medicală adecvată.

DIRECTOR EXECUTIV,
DR.BOERIU MARIUS CONSTANTIN

BIROU RELATII CU PUBLICUL
CONS.PR.PITIAN ELENA