



MINISTERUL
SANATATII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ



CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI
PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂȚATE



CENTRUL REGIONAL DE
SĂNĂȚATE PUBLICĂ TIMIȘOARA

CANCERUL

Cancerul (neoplasmul malign) reprezintă o categorie de boli caracterizate printr-o diviziune necontrolată a unui grup de celule, care au capacitatea de a invada alte tesuturi din organism, fie prin creștere directă în tesuturi adiacente (invazie), fie prin migrația celulelor în organism (metastază).

Diviziunea și înmulțirea necontrolată a celulelor este declansată de anomalii ale ADN-ului celulelor canceroase. Aceste anomalii apar ca o consecință a integrării unor virusuri în genomul celular sau a mutațiilor genelor care controlează înmulțirea acestor celule. Una sau mai multe astfel de mutații pot duce la diviziunea și înmulțirea necontrolată a celulelor, cu formarea unei tumori maligne.

Tumorile maligne sunt acele tumori care au capacitatea de a invada alte tesuturi, fie din vecinătate (prin invazie tumorală), fie la distanță (prin metastaze tumorale). Simptomele bolii depind de tesutul afectat sau de localizarea tumorii primare și de mărimea acesteia, de stadiul bolii și de prezența sau absența metastazelor.

Un diagnostic pozitiv exact necesită examinarea anatomo-patologică a tesutului afectat, examenul microscopic confirmând și precizând natura cancerului. Fragmentele de țesut pentru analiză se pot obține prin biopsie sau prin intervenție chirurgicală, în cazul tumorilor solide, sau prin puncție în cazul tesuturilor lichide (de exemplu prin puncție medulară, în cazul leucemiilor).

Evoluție și prognostic: cancerele depistate și tratate în stadiile incipiente pot fi vindecate; cancerele depistate în stadii avansate sau netratate evoluează invariabil spre deces.

A. Impactul bolii -perspectiva a sanatatii publice

Cancerul reprezintă o problema majoră de sănătate publică, pe plan mondial, existând variații considerabile în incidență, mortalitate, supraviețuire, factori determinanți de mediu, programe mixte de prevenire, detectare, tratament, paleativ.

Dacă nu se intervine efectiv prin programe de prevenire și screening, numărul de cazuri noi va crește de la 10 milioane în 2000 la 15 milioane în 2020, dintre care 9 milioane în țările în curs de dezvoltare. Povara prin cancer ar putea atinge până în anul 2050, 24 milioane cazuri/an/global, cu 17 milioane în țările în curs de dezvoltare (Parkin, Bray, Devesa 2001).

Datele legate de incidență, prevalența și mortalitatea prin cancer sunt incomplete în țările în curs de dezvoltare comparativ cu țările dezvoltate, acestea din urmă având infrastructura și resursele (umane și materiale) necesare implementării și menținerii registrelor populationale de cancer.

Cu toate aceste limitări obiective, epidemiologia cancerului în țările în curs de dezvoltare diferă de cea a țărilor dezvoltate: țările dezvoltate prezintă rate ridicate de cancer pulmonar, colorectal, sân și prostată, ca urmare a debutului precoce a epidemiei tabagice, a expunerii timpurii la carcinogenii ocupaționali, dietei și stilului de viață occidental din aceste țări; în contrast, până la ¼ din cancer în țările în curs de dezvoltare sunt asociate cu infecțiile cronice. Cancerul hepatic este frecvent asociat cu infecția cu *virusul hepatitic B* (HBV), cancerul de col uterin este asociat cu infecția cu anumite tipuri de *papillomavirus uman* (HPV), iar cancerul de stomac este asociat cu infecția cu *Helicobacter pylori*.

În țările în curs de dezvoltare, șapte tipuri de cancer (col uterin, ficat, stomac, esofag, plămân, colorectal, sân), determină 60% din cazurile noi și decesele prin cancer (Ferlay et al, 2001). Dintre aceste tipuri, cancerul de col uterin, hepatic, stomac și esofag, prezintă rate crescute de incidență și mortalitate și în țările dezvoltate. Cancerul de plămân, colorectal, sân, prezintă rate în creștere, ca urmare a modificărilor demografice și industriale.

B. Povara bolii in tarile in curs de dezvoltare

Primele cinci localizari la femei, in ordinea incidentei sunt: san, col uterin, stomac, plaman si colorectal; cancerul de col uterin determina mai multe decese decat cancerul de san.

Primele cinci localizari la barbati sunt: plaman, stomac, ficat, esofag si colorectal .

Cancerle mai frecvente in tarile in curs de dezvoltare sunt legate si de absenta unei infrastructuri bine dezvoltate pentru controlul agentilor infectiosi oncogeni, absenta serviciilor preventive si de screening pentru mare parte din populatie, alimentatie de calitate slaba pentru populatia dezavantajata economic.

Cresterea frecventei cancerelor pulmonar, san, colorectal reflecta occidentalizarea stilului de viata, speranta de viata mai buna si globalizarea pietei pentru produsele din tutun.

C. Tipuri de interventii pentru controlul cancerului

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda urmatoarele abordari pentru strategia de control:

Preventia primara

Scopul interventiei este reducerea sau eliminarea expunerii la factorul de risc: carcinogeni din mediu, stilul de viata nutritie, activitate fizica. Pentru cele sapte tipuri de cancer mentionate, preventia primara include imunizarea sau tratamentul infectiilor; programe de control al consumului de tutun; reducerea consumului de alcool; controlul produselor, suplimentelor alimentare si dietei; controlul farmacologic. Preventia primara în cancer vizează cauza bolii, atunci când aceasta este cunoscută, si eliminarea factorilor de risc. Unele cancer sunt provocate de virusuri oncogene, si ar putea fi prevenite prin vaccinare împotriva virusului respectiv. Este cazul carcinomului hepatocelular, apărut pe fondul infectiei cronice cu virusul hepatitei B si al cancerului de col uterin, care s-a dovedit că apare numai în prezenta infectiei cronice cu tipurile oncogene de *papilomavirus uman* (HPV).

Vaccinul împotriva hepatitei B a intrat în uz la începutul anilor 1980, fiind introdus în Programul National de Imunizare din România în 1995. În ceea ce priveste HPV, există vaccinuri împotriva a 2 din tipurile oncogene de papilomavirus (16 si 18), responsabile de majoritatea cancerelor de col uterin (aprox. 70%). S-a dovedit că vaccinarea înainte ca organismul să vină în contact cu aceste tipuri de virus (înainte de începutul vietii sexuale) împiedică infectia ulterioară si previne aparitia leziunilor precanceroase produse de aceste tipuri virale la nivelul colului uterin. Pe termen lung, se estimează că vaccinarea sistematică a fetelor va duce la o scădere importantă a incidentei cancerului de col uterin, prin eliminarea cazurilor generate de aceste 2 tipuri virale cancerigene. Deoarece vaccinul nu conferă protectie față de toate tulpinile virale oncogene, este necesar ca si femeile vaccinate să efectueze screening periodic pentru depistarea precoce a cancerului de col.

În România, vaccinurile împotriva HPV sunt disponibile pentru vaccinare optională din anul 2007, iar vaccinarea gratuită împotriva HPV a fost introdusă în campanii scolare în toamna anului 2008 si s-a efectuat la fetele de 9-10 ani, în clasa a IV-a, cu acordul scris al părintilor sau tutorilor. Ulterior, grupa de vârstă vizată a fost cea de 12-14 ani (clasa a VI-a si a VII-a), cu posibilitatea de vaccinare gratuită si a femeilor în vârstă de până la 24 de ani, la indicatia medicului ginecolog.

Multe forme de cancer sunt asociate cu factori de mediu pot fi prevenite. Dintre factorii de risc pentru aparitia cancerului, care ar putea fi evitati, fac parte radiatiile ionizante (prin exces de proceduri de radiodiagnostic sau radioterapie), fumatul, diverse substante chimice sau medicamente implicate în carcinogeneză.

Detectarea precoce si preventia secundara

Scopul interventiei este detectarea cancerului, prin programe de screening populational, in stadiile incipiente, precanceroase, care sunt curabile prin tratament specific. Interventiile pot reduce mortalitatea prin cancer, doar daca se constituie într-o strategie ampla, inclusiv proceduri efective de supraveghere si tratament (Anderson et al, 2003). Aceste proceduri exista pentru cancerle de col uterin, colorectal si de san, dar implementarea si utilizarea lor s-a dovedit neuniforma geografic (Sankaranarayanan et al, 2008).

Metoda de screening depinde de tipul de cancer vizat: screeningul pentru cancerul pulmonar se realizează prin efectuarea anuală a examenului radiologic pulmonar; metoda de screening pentru cancerul de col uterin este examenul citologic Babes-Papanicolau, care în mod ideal ar trebui efectuat la toate femeile active sexual de 2 ori pe an sau măcar anual; pentru cancerul de sân, pe lângă autopalpare sau palparea sistematică a sânului cu ocazia oricărui consult medical, există screeningul prin mamografie;

pentru cancerul hepatic se incearca testarea serica a alfafetoproteinelor si ultrasonografia; pentru cancerul de stomac, Japonia, tara cu rate crescute de incidenta, utilizeaza tehnici de radiologie si endoscopie, la grupa de varsta 40-50 ani; pentru cancerul colorectal, metodele de screening includ testul hemocult, sigmoidoscopie, clisma baritata si colonoscopie. (Pignone et al, 2002).

Studiile referitoare la raportul cost-beneficiu in interventiile de control al cancerului s-au efectuat, cu precadere, in tarile dezvoltate si este dificil de estimat acest raport pentru tarile slab/mediu dezvoltate; acolo unde aceste interventii exista, se poate transforma raportul cost-beneficiu in procent din PIB/capita.

Diagnostic si tratament

Există trei posibilități de tratament curativ al unui cancer: cură chirurgicală, chimioterapie si radioterapie. Fiecare din aceste metode poate fi aplicată singură sau în diverse combinatii cu celelalte. Cura chirurgicală vizează îndepărtarea tumorii maligne si a tesuturilor invadate tumoral. Chimioterapia si radioterapia vizează distrugerea celulelor canceroase din tumora primară si de la nivelul metastazelor.

Cancerle depistate în stadii avansate nu sunt curabile. În aceste situatii se aplică tratamente paliative, cu scopul de a controla simptomele supărătoare si a ameliora calitatea vietii pacientilor aflati în stadii avansate de boală. Cel mai cunoscut simptom al cancerului care beneficiază de tratament paliativ este durerea canceroasă. Un alt simptom este icterul mecanic, prin compresie tumorală din cadrul neoplasmului de cap de pancreas, care beneficiază de tratament paliativ chirurgical. Scopul ingrijirii paliative a fost extins, pentru suportul simptomelor si tratamentului in toate fazele bolii - de la diagnosticare la deces - si includerea aspectelor fiziologice, psihologice si de calitate-a-vietii pacientului; aceasta ia in considerare starea de bine a pacientului si membrilor familiei (Singer, Bowman 2002).

Exista tendinta globala de dezvoltare a centrelor specializate de cancer, care aplica tratamente multimodale bazate pe dovezi, inclusiv reabilitarea si ingrijirea paliativa.

Debut la scara mica, dezvoltare inteligenta

Deoarece cunoasterea actuala asupra eficientei, resurselor optime, costului interventiilor pentru controlul cancerului este deficitara in tarile slab/mediu dezvoltate, este indicat un inceput de drum la scara mica - se poate castiga cunoasterea prin programe pilot bine documentate, organizate si procesate, monitorizate pentru eficienta si performanta. Astfel, un program nou de screening sau tratament poate fi initiat in zone geografice specifice sau in unitati medicale specifice, cu populatie tinta binecunoscuta si bine caracterizata/ apoi, rezultatele pot fi comparate cu zone/unitati similare. Tarile in curs de dezvoltare pot lua in considerare extinderea unui program-pilot, doar dupa ce acesta s-a dovedit performant.

Un debut util ar putea insemna un program pilot aplicat initial unei grupe de varsta estimata a beneficia la maxim de folosirea resurselor, sau la un grup limitat de indivizi la risc, definiti prin diverse caracteristici de risc, cum ar fi gradul unu de rudenie cu pacienti cu cancer. Versiuni ale acestei abordari au caracterizat diseminarea multor interventii pentru controlul cancerului, in tarile dezvoltate.

Programele organizate de screening pentru cancerul de san, in unele tari ale Uniunii Europene, au fost implementate ca programe pilot in regiuni specifice si evaluate in raport cu populatia de control (Fracheboud et al 2001), iar programele regionale/nationale s-au limitat initial la grupa de varsta si procedurile de screening eficiente. Programele au fost apoi extinse, in sensul diversificarii procedurilor folosite, intervale mai frecvente de screening, grupe de varsta mai largi, dupa ce monitorizarea si analiza performantei initiale a indicat cresterea cost-eficientei, prin extindere (Shapiro, Steele et al 2001).

Orizontul de timp

Este relevant pentru politicieni si strategii unui sistem de sanatate; de exemplu, un program de vaccinare HPV are un orizont lung de asteptare. Similar, un program adecvat de screening pentru cancerul de stomac isi dovedeste utilitatea dupa patru decenii de la initiere.

Decidentii trebuie sa tina cont de aceste perioade de asteptare cand interpreteaza si calculeaza rate cost-beneficiu; oricum orizontul lung de asteptare pentru prevenirea cancerului si interventiile de depistare precoce nu reprezinta, in sine, un argument impotriva aplicarii acestor interventii.

In unele cazuri, tarile nou intrate pe taramul controlului cancerului, pot beneficia din experienta tarilor dezvoltate si prin directionarea progresului tehnic spre acest scop.

Obținerea unei balante temporale optime in controlul cancerului, reprezinta marea provocare pentru planificarea, implementarea si evaluarea interventiilor viitoare.

Tabelele si graficele urmatoare, ilustreaza situatia cazurilor noi de imbolnavire si deces prin cancer in tara noastra, pe situsuri topografice, raportate la populatia totala/masculina/feminina, anul 2008.

D. ROMANIA - DATE STATISTICE

Analiza	M	F	Ambele sexe
Populatie pe sexe	10389000	10971000	21361000
Numar de cazuri noi de cancer	37.400	32.900	70.300
Rata standardizata de incidenta la 100 000	240.6	179.6	205.1
Riscul de imbolnavire inainte de 75 ani (%)	24.9	18.1	21.1
Numar decese prin cancer	27.400	18.900	46.300
Rata standardizata de mortalitate la 100 000	171.4	91.8	126.9
Riscul de deces inainte de 75 ani (%)	18.7	9.8	13.9
Cele mai frecvente localizari			
	Plămân	Sân	Plămân
	Colorect	Colorect	Colorect
	Prostata	Col uterin	Sân
	Stomac	Plămân	Stomac
	Vezica biliară	Ovar	Prostata

Definire termeni

Rata reprezinta numarul de cazuri noi/decese (exprimata la 100000 locuitori, pe an)


Rata standardizata pe varsta reprezinta rata aferenta populatiei, daca ar exista o structura standard a acestei populatii. Standardizarea este necesara cand comparam populatii diferite ca varsta, deoarece varsta are o influenta majora in riscul de cancer.

Riscul de imbolnavire sau deces prin cancer inaintea varstei de 75 ani (exprimat procentual %) reprezinta probabilitatea sau riscul de imbolnavire al indivizilor prin cancer. Se exprima prin numarul asteptat de nou-nascuti (din 100) care vor dezvolta sau vor deceda prin cancer inainte de 75 ani (in absenta altor cauze de deces).

INCIDENTA SI MORTALITATEA PRIN CANCER, 2008

ROMANIA

International Agency for Research on




TOTAL

Topografia tumorii	Incidenta		Mortalitatea	
	Numar	RS	Numar	RS
Buza, cavitata orala	1556	4.8	841	2.6
Nazofaringe	271	1.0	171	0.6
Alte faringe	1217	4.2	951	3.1
Esofag	681	2.0	644	1.9
Stomac	4001	10.3	3819	9.7
Colorect	8696	22.8	5178	12.7
Ficat	1971	5.3	2686	6.9
Vezica biliara	648	1.6	448	1.1
Pancreas	2866	7.5	2619	6.8
Laringe	1427	4.5	1002	3.0
Plaman	10384	30.0	9427	26.8
Melanom	903	2.8	342	1.0
San	7929	45.4	3101	15.6
Col uterin	3402	23.9	2005	11.8
Corp uterin	1208	6.8	388	1.9
Ovar	1686	9.4	981	5.1
Prostata	3620	19.9	1757	8.9
Testicul	219	1.9	59	0.4
Rinichi	1446	4.4	756	2.1
Vezica urinara	3112	8.0	1392	3.3
Creier, sistem nervos	1788	6.2	1463	4.8
Tiroida	615	2.2	133	0.3
Limfom Hodgkin	242	1.0	144	0.5
Limfom non-Hodgkin	1392	4.3	720	2.2
Mielom multiplu	540	1.5	297	0.8
Leucemie	1532	4.8	1246	3.8
Toate, excl. cancer piele non-melanomatos	70262	205.1	46301	126.9

INCIDENTA SI MORTALITATEA PRIN CANCER, 2008

ROMANIA




BARBATI

Topografia tumorii	Incidenta		Mortalitatea	
	Numar	RS	Number	RS
Buza, cavitate orala	1364	9.4	753	5.2
Nazofaringe	172	1.3	131	0.9
Alte faringe	1135	8.3	879	6.2
Esofag	578	3.9	547	3.5
Stomac	2650	15.9	2535	15.2
Colorect	4554	27.6	2884	16.7
Ficat	1279	8.1	1722	10.5
Vezica biliara	293	1.7	203	1.2
Pancreas	1682	10.3	1535	9.4
Laringe	1351	9.4	946	6.2
Plaman	8387	54.6	7581	48.8
Melanom	387	2.7	180	1.2
Prostata	3620	19.9	1757	8.9
Testicul	219	1.9	59	0.4
Rinichi	870	5.9	493	3.1
Vezica urinara	2502	15.0	1122	6.3
Creier, sistem nervos	864	6.5	771	5.6
Tiroida	142	0.9	39	0.2
Limfom Hodgkin	119	1.0	82	0.6
Limfom Non-Hodgkin	740	5.2	409	2.8
Mielom multiplu	224	1.4	140	0.9
Leucemie	898	6.3	685	4.6
Toate, exc. cancer cutanat nemelanomatos	37386	240.6	27439	171.4

INCIDENTA SI MORTALITATEA PRIN CANCER, 2008

ROMANIA


International Agency for Research on



FEMEI


Topografie Cancer	Incidenta		Mortalitate	
	Numar	RS	Numar	RS
Buza, cavitate orala	192	0.8	88	0.4
Nazofaringe	99	0.6	40	0.3
Alte faringe	82	0.5	72	0.4
Esofag	103	0.5	97	0.4
Stomac	1351	5.8	1284	5.4
Colorect	4142	19.0	2294	9.7
Ficat	692	3.0	964	4.0
Vezi ca biliara	355	1.6	245	1.1
Pancreas	1184	5.2	1084	4.7
Laringe	76	0.4	56	0.3
Plaman	1997	9.8	1846	8.8
Melanom	516	2.9	162	0.9
San	7929	45.4	3101	15.6
Col uterin	3402	23.9	2005	11.8
Corp uterin	1208	6.8	388	1.9
Ovar	1686	9.4	981	5.1
Rinichi	576	3.1	263	1.3
Vezi ca urinara	610	2.5	270	1.0
Creier, sistem nervos	924	6.0	692	4.1
Tiroida	473	3.5	94	0.4
Limfom Hodgkin	123	1.0	62	0.4
Limfom non-Hodgkin	652	3.5	311	1.6
Mielom multiplu	316	1.7	157	0.8
Leucemie	634	3.5	561	3.1
Toate, excl.cancer piele non-melanomatos	32876	179.6	18862	91.8

SDR, malignant neoplasms, all ages per 100000




Sursa: WHO- Health for All Data Base

Cancer incidence per 100000



Sursa: WHO- Health for All Data Base

Cancer prevalence, in %



Sursa: WHO- Health for All Data Base

Datele statistice din ultimii ani, situează România printre țările situate pe un loc mediu în ceea ce privește rata standardizată a mortalității în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, și cu ratele incidenței și prevalența cele mai mici dar cu tendința crescătoare. Există o tendință la creștere lentă, dar progresivă a îmbolnăvirilor și a mortalității prin cancer, valabilă pentru mediile urbane și rurale și ambele sexe, cu precădere la cel masculin.

Din punctul de vedere al structurii morbidității și mortalității, pe sexe, în raport cu localizarea tumorală, statistici recente arată următoarea situație: la bărbați, pe primul loc al ratelor de mortalitate prin cancer se situează cancerul bronhopulmonar, urmat de cancerul colorectal, de prostată, de stomac, vezica biliară și bolile maligne de sistem; la femei, prima cauză de deces prin tumorile maligne este cancerul mamar, urmat, ca frecvență, de tumorile maligne ale aparatului genital (col uterin, corp uterin, ovar), de cancerul colorectal, bronhopulmonar, bolile maligne de sistem.

E. Cadrul legislativ

În România a fost elaborat un program național complex, transpus legislativ în HG nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012; acesta reprezintă un ansamblu de acțiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului și controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației, inclusiv cancerul (<http://www.insp.gov.ro/cnepss/strategii/politici-strategii-programe/planul-de-actiune/programe-nationale/>):

I. PROGRAME NAȚIONALE CU SCOP PREVENTIV

Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

Obiectiv:

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin promovarea unui stil de viață sănătos și combaterea principalilor factori de risc

Structura:

1. Subprogramul de promovare a unui stil de viață sănătos;
2. Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun;
3. Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populației.

Programul național de oncologie

Obiective:

- a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populației feminine eligibile;
- b) diagnosticarea în stadii incipiente a cancerului de col uterin, cancerului mamar și cancerului colorectal;
- c) tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
- d) monitorizarea evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice;
- e) realizarea, implementarea și managementul Registrului național de cancer.

Structura:

Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar;
Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului colorectal;
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT.

II. PROGRAME NAȚIONALE CU SCOP CURATIV

Programul național de oncologie

Obiective:

- a) tratamentul pacienților cu afecțiuni oncologice;
- b) monitorizarea răspunsului la tratament specific al bolnavilor cu afecțiuni oncologice.

Structura:

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice.

F. Campanii de informare, educare, comunicare 2009

Campanie de prevenire a cancerului de piele, a afecțiunilor oculare și a altor efecte ale expunerii la radiațiile UV solare asupra sănătății - 5 județe

Campania Națională de Informare pentru Prevenirea Cancerului de Col Uterin prin Vaccinarea anti-HPV -4 județe

Campanie de celebrare a Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului de Sâni - 4 județe

Marcarea Lunii Internaționale de Informare despre Cancerul de Sâni - 3 județe

Referințe

J. Ferlay, D.M. Parkin, E. Steliarova-Foucher. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J. Cancer 2010;46(4):765–81.

International Agency for Research on Cancer www.iarc.fr

WHO Health for All Data Base